

Cómo cuidar a su hija después de una corrección de cloaca o una uretroplastia vaginal anorrectal sagital posterior

Una uretroplastia vaginal anorrectal sagital posterior (PSARVUP) es una operación en la que se corrige una deformación conocida como “cloaca” o “cloaca persistente”. Este defecto congénito (de nacimiento) ocurre cuando en vez de que una bebé nazca con tres aberturas (una para el sistema urinario, una para el sistema digestivo y una para el sistema reproductivo) nace con una sola.

Nuestros cirujanos harán una operación para crear las tres aberturas. A veces, solo hace falta hacer una incisión entre las nalgas para operar, pero en casos más complicados, a veces se necesita hacer otra incisión en la barriga.

A continuación encontrará instrucciones para cuidar a su hija después de la operación.

¿Qué puede comer mi hija?

Su hija puede comer lo de siempre.

¿Qué medicamentos tomará?

- Tomará acetaminofén (Tylenol) e ibuprofeno (Motrin) para el dolor. Si tiene menos de seis meses o ha tenido problemas de riñón, no le dé Motrin.
- No le dé laxantes ni le ponga enemas o supositorios. Si cree que está estreñida (el excremento sale duro o no va mucho al baño), llame a la clínica.

¿Qué no se debe hacer después de la operación?

- No se debe meter nada por el recto ni el ano de su hija. No le ponga supositorios ni le tome la temperatura por el recto hasta que el cirujano lo autorice.
- Su hija no puede estar de piernas abiertas durante tres meses. Por ejemplo, no se la ponga en la cadera para cargarla ni la deje subirse a juguetes que le abran las piernas.
- No deje que se meta al agua durante cuatro semanas.

¿Puede ir a la escuela o a la guardería?

Puede ir si ya no tiene dolor y el personal de la guardería o la escuela saben cómo limpiar la incisión. Por lo general, esto es 5 o 7 días después de la operación.

¿Puedo bañarla?

- Solo puede bañarla en la ducha (regadera) o darle baños de esponja.
- No debe meterla en la bañera (o tina) durante dos semanas.

¿Cómo debo atender la incisión en casa?

- No deje que se moje ni se ensucie. Limpie el área con agua tibia y jabón. Puede usar una botella para rociar agua con jabón sobre la incisión.
- Seque con cuidado la piel con un paño suave. No la frote.
- Tampoco use toallitas húmedas con productos químicos.

- No le abra las nalgas, pues podría abrirse la incisión.
- Si su hija tiene una incisión en el abdomen, manténgala limpia y seca. No hay problema si se moja cuando se duche o bañe. Séquela sin frotarla, o tallarla.

¿Qué debo hacer con el estoma de mi hija?

Siga haciendo lo de siempre: mantenga la piel limpia y cambie la bolsa como de costumbre.

¿Qué debo hacer con la sonda Foley (la manguera por donde sale la orina)?

- Si a su hija le dejaron puesta una sonda Foley, póngale dos pañales y entre los dos pañales ponga la sonda para que no se mueva mucho.
- Vaya a la Clínica de Urología para que le quiten la sonda.

Consulta de revisión:

Llame a la Clínica de Cirugía General al 214-456-6040 para pedir una cita con el cirujano aproximadamente dos semanas después de la operación. En esa consulta, es posible que le enseñemos cómo hacer dilataciones anales en casa.

Llame a la clínica al 214-456-6040 si:

- La incisión está sangrando (si no es solo unas cuantas gotas)
- La incisión está roja o hinchada, o tiene pus
- La temperatura le sube a más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados)
- Su hija tiene vómito verde o no deja de vomitar
- Tiene dolor de barriga y está empeorando
- Lleva 24 horas sin hacer popó
- Lleva seis horas sin orinar
- Usted tiene alguna pregunta