

Notas del Globo

Los cuidados de su niño.



Enoxaparina (Lovenox®): preguntas y respuestas

¿Qué es la enoxaparina?

La enoxaparina también es llamada Lovenox®. La enoxaparina hace que sea más difícil que la sangre forme coágulos. Un coágulo se forma cuando la sangre se aglutina. Este medicamento trata los coágulos o previene que los mismos se formen.

Donde administrar las inyecciones:

Detrás de los brazos, muslos o estómago

¿Cómo administro enoxaparina a mi niño?


Administrará este medicamento como una inyección en la zona grasa debajo de la piel de su niño/a. Administre la inyección en un lugar diferente cada vez. Administre la inyección exactamente como lo indicó su médico y a la misma hora cada día.

¿Qué hago con las jeringas y las agujas usadas?

Deseche las agujas y jeringas usadas en un recipiente duro y cerrado. Puede comprar un recipiente de objetos puntiagudos en una farmacia local y use un recipiente de plástico grueso de su hogar, como un envase de detergente para ropa vacío.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la enoxaparina?

Su niño/a puede sangrar o formar moretones con más facilidad. También es posible que su niño sienta un dolor leve, forme moretones, irritación y pequeños bultos donde le administre la inyección.




Si su niño/a tiene cualquiera de estos signos, llame a la clínica* de su niño/a de inmediato:

* Consulte la información de contacto en la siguiente página

- Sentirse débil o mareado
- Sangrados nasales que duran más de 20 minutos con presión
- Sangre en su vómito
- Vómito que parece granos de café
- Orina rosada o marrón
- Heces rojas o negras
- Períodos menstruales más abundantes o largos

Notas del Globo

Los cuidados de su niño.



Acuda a la sala de emergencias más cercana si su niño/a tiene:

- Un dolor de cabeza muy fuerte
- Dificultad para hablar o debilidad en un lado del cuerpo
- Una lesión grave en otras partes del cuerpo
- Una lesión en la cabeza
- Dolor en el pecho o dificultad para respirar
- Sangrado que no se detiene después de aplicar presión por 20 minutos

¿Qué hago si mi niño/a deja de tomar una dosis?

- Si es **menos** de cuatro horas tarde, **ADMINISTRE** la dosis
- Si es **más** de cuatro horas tarde, **LLAME** a la clínica de su niño/a



Es importante que administre enoxaparina a su niño cada día
Saltarse o dejar de tomar una dosis puede hacer que la enoxaparina no funcione tan bien

¿Qué hago si a mi niño/a se le está agotando la enoxaparina?

Llame a su farmacia para solicitar un resurtido de 5 días antes de que a su niño se le acaben las píldoras de enoxaparina. Llame a la clínica de su niño/a de inmediato si tiene problemas con los resurtidos.

¿Qué pruebas necesita mi niño/a mientras toma enoxaparina?

Su niño/a necesita tener pruebas de sangre regulares llamadas niveles de enoxaparina o niveles de anti-Xa. Este nivel se mide extrayendo sangre de su niño/a. El resultado se usa para asegurarse de que el nivel de enoxaparina esté en un rango seguro.




Asegúrese de asistir a todas las citas de seguimiento y laboratorio
El médico necesitará revisar los análisis de sangre de su niño/a con regularidad

¿Qué medicamentos o alimentos debe evitar mi niño/a mientras toma enoxaparina?

Algunos medicamentos pueden afectar la forma en que la enoxaparina trabaja. Llame a la clínica de su niño/a antes de comenzar cualquier receta o medicamentos de venta libre, suplementos dietéticos o herbales. Evite el ibuprofeno (Advil® o Motrin®), naproxeno (Aleve®), y la aspirina (a menos que lo haya conversado con la clínica de su niño/a). Su niño/a no necesita evitar ningún tipo de alimentos mientras toma enoxaparina.

Notas del Globo

Los cuidados de su niño.



¿Qué más debería saber sobre la enoxaparina?

- Evite los deportes de contacto como el fútbol, boxeo o jugar a los quemados
- Infórmele al dentista y a otros médicos de su niño/a que el mismo se encuentra tomando enoxaparina
- Avísele a la clínica de su niño/a antes de cualquier trabajo dental o cirugía planificada para su niño/a
- No deje de administrar el rivaroxabán sin hablar con la clínica de su niño/a

¿A quién llamo para hablar sobre la enoxaparina de mi niño/a?

- Póngase en contacto con el médico que gestiona el Lovenox de su niño/a

El Centro del Corazón (Heart Center)	Programa de Hemofilia y Trombosis del Centro para el Cáncer y Trastornos Sanguíneos (Center for Cancer and Blood Disorders, CCBD)
De lunes a viernes De 8 a.m. a 5 p.m. Teléfono: 214-456-2333 Fax: 214-456-8130	De lunes a viernes De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: 214-456-2379 Fax: 214-456-8469
<i>Para hacer preguntas fuera del horario de la clínica, siga las instrucciones de la clínica para llamar al médico de guardia.</i>	